

SORBENT ŚCIÓŁKOWY DO SUCHEJ DEZYNFEKCJI

1. Informacje ogólne

Naturalny produkt zoohigieniczny w postaci proszku służący do osuszania, sanityzacji budynków inwentarskich, oraz miejsc przebywania zwierząt. Preparat o bardzo szerokim spektrum działania, który gwarantuje wysoką skuteczność i długotrwałą ochronę obiektów inwentarskich. Produkt nie zawiera żadnych składników syntetycznych, co czyni go bezpiecznym w stosowaniu. Mechanizm działania oparty jest na naturalnych właściwościach minerałów sorpcyjnych połączonych w unikalnych proporcjach dla zapewnienia optymalnego działania. Produkt posiada doskonałe właściwości higroskopijne, co czyni go bardzo efektywnym środkiem antyzbrylającym. Charakteryzuje się wysoką zdolnością do pochłaniania wilgoci. Efektywnie osusza ściółki oraz legowiska. Eliminuje ryzyko występowania wielu chorób. Ogranicza rozwój larw much i poprawia mikroklimat w pomieszczeniach inwentarskich. Ponadto może być stosowany w obecności zwierząt, ponieważ jest dla nich bezpieczny. Rozsypanie go na powierzchnię odkażaną zapewnia długotrwałą ochronę zwierząt przed chorobami.

Działanie preparatu

- ✓ Natychmiastowe osuszenie dezynfekowanej powierzchni,
- ✓ Wpływ na dłuższe użytkowanie ściółki (absorpcja wilgoci, moczu, kału),
- ✓ Minimalizuje wystąpienia wielu chorób,
- ✓ Długotrwała i skuteczna ochrona,
- ✓ Może być stosowany w obecności zwierząt, nie powoduje kichania – nie pyli,
- ✓ Wpływa na zwiększenie komfortu chowu zwierząt, utrzymując poprawną higienę legowisk,
- ✓ Obniża wilgoć,
- ✓ Nie ulega metabolizmowi, nie ulega degradacji,
- ✓ Nie powoduje skutków ubocznych – niezmienna struktura krystaliczna.

2. Zastosowanie

Sorbent przeznaczony jest dla różnych gatunków zwierząt gospodarskich tj. trzoda chlewna, bydło, drób. Preparat może być stosowany na wszystkie rodzaje posadzek i ściółek. Preparat stosuje się poprzez rozsypywanie na powierzchnię co 2-3 tygodnie.

Dawkowanie:

Trzoda chlewna, bydło:

Preparat rozsypać na powierzchni przeznaczonej do suchej dezynfekcji – w ilości 350g do 450g produktu /m² powierzchni.

Drób:

Preparat rozsypać na powierzchni przeznaczonej do suchej dezynfekcji – w ilości 200g do 250g produktu /m² powierzchni.

Regularne stosowanie preparatu znacznie poprawia warunki bytowe zwierząt i ma istotny wpływ na dobrostan zwierząt. Nie zaobserwowano spożywania preparatu przez zwierzęta.

Podczas dezynfekcji suchej zwrócić szczególną uwagę na miejsca:

- ✓ Występowania dużej koncentracji zwierząt,
- ✓ Drogi komunikacyjne dla zwierząt,
- ✓ Odpoczynku krów: podłóż pod wymionami, dezynfekcje racic,
- ✓ Linie poidel – ze względu na specyfikację miejsca efekt działania sorbentu może być krótszy.

3. Parametry techniczne

Postać	proszek
Wilgotność	max 5 %
Wodochłonność wg DIN	min 160%
pH	neutralne, lekko kwaśne

4. Skład

glinokrzemiany, haloizyt, bentonit, kwas cytrynowy

5. Pakowanie

- Big – bag 1000 kg
- Worek 25 kg